

Echogeleide marcaïnisatie van een gewricht (gewrichtsverdoving)

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u besloten om bovenstaand onderzoek te laten verrichten. In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Wat is een marcaïnisatie en wat is het doel hiervan?

Tijdens een marcaïnisatie krijgt u een verdoving in het gewricht toegediend met behulp van echografie (en bij uitzondering onder röntgendoorlichting). Meestal betreft het het heup-, enkel-, pols- of schoudergewricht, maar andere gewrichten behoren ook tot de mogelijkheden. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of de (pijn)klachten daadwerkelijk te maken hebben met het gewricht. Soms wordt op verzoek van uw arts ook nog een ontstekingsremmer / corticosteroid toegediend.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, overleg dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen. Het gebruik van Ascal is in veel gevallen wel toegestaan. Wanneer uw bloed te dun is, kunnen sommige onderzoeken geen doorgang vinden.

Overgevoeligheid

Als u overgevoelig bent voor verdovingsvloeistof of contrastmiddel of corticosteroid, dan dient u dit te melden aan uw arts.

Vorbereiding

U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek (u hoeft niet nuchter te zijn).

Het onderzoek

Een radioloog voert het onderzoek uit met assistentie van een radiodiagnostisch laborant. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van echografie (en bij uitzondering onder röntgendoorlichting). Voordat het onderzoek begint, ontbloot u het betreffende lichaamsdeel, waarna u plaats neemt op de onderzoekstafel of stoel. Allereerst wordt de injectie-plaats gedesinfecteerd. Met behulp van echografie kan de radioloog de plaats van de injectie nauwkeurig bepalen en zien hoe de naald in het gewricht wordt geplaatst. Vervolgens wordt een injectievloeistof toegediend, bestaande uit een combinatie van verdoving (en eventueel contrastmiddel). Door het toevoegen van een contrastmiddel wordt het medicijn zichtbaar op röntgenbeelden. Het totale onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Als er contrast is toegevoegd wordt aansluitend een controle röntgenopname vervaardigd om te bewijzen dat de procedure geslaagd is.

Na het onderzoek

Het onderzochte gewricht kan nog enige tijd gevoelig en dik zijn (zelden), daarom is zelf autorijden en fietsen niet verantwoord en raden wij aan vooraf vervoer naar huis te regelen.

Na onderzoek van heup of schouder kan kortstondig krachtverlies van been of arm optreden, hoewel dit zelden optreedt. Het is toegestaan het geïnjecteerde gewricht te gebruiken, echter het wordt afgeraden het gewricht zwaar te belasten de dag van de procedure.

Eventueel gestaakte bloedverdünnende medicatie kunt u meestal de dag na het onderzoek weer hervatten.

Complicaties

Elke medische handeling kent risico's en mogelijke complicaties, die uw behandelend arts met u besproken heeft. Bij dit onderzoek is de kans op complicaties laag. Zo kan er bijvoorbeeld een nabloeding ('blauwe plek')

ontstaan, die eigenlijk altijd restloos geneest. In zeer zeldzame gevallen kan er een gewrichtsontsteking ontstaan. Als er na de procedure iets 'verandert' (bijvoorbeeld veel pijn, zwelling, warmte, roodheid of koorts) dan dient u dat te melden aan uw behandelend arts of de afdeling radiologie.

Uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt de uitslag toegestuurd en zal deze met u bespreken. Over het algemeen is de uitslag binnen één werkdag digitaal beschikbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie tussen 8.00 en 17.00. Telefoonnummer 085-0600851.

Verhinderung

Mocht u op het afgesproken tijdstip toch verhinderd zijn, belt u dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie op telefoonnummer 085-0600851. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Tot slot

Wij doen er alles aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw onderzoek of behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen of met het hoofd van onze afdeling. Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website mkvelsen.nl of u kunt mailen naar klachten@mkvelsen.nl.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

المعلومات في هذا المجلد مهمة بالنسبة لك. إذا كنت تواجه مشكلة في اللغة الهولندية، فتأكد من قراءة هذا المجلد مع شخص يترجم أو يشرح لك المعلومات.